

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

REGION POITOU-CHARENTES

Bulletin technique n°05 du 12 mars 1998- 1 page

Grandes Cultures

COLZA : stade D2 à E Mélégèthes

Situation

Le vol est faible (125 captures seulement). Le temps n'est pas favorable ; l'activité au champ est nulle. La nuisibilité s'arrête début floraison.

Préconisation

Traitement inutile.

Pucerons cendrés

Situation

Certaines parcelles sont infestées de pucerons cendrés, notamment en Deux-Sèvres, Charente et Charente-Maritime. Malgré le petit nombre de pucerons par colonies : ceux-ci risquent de provoquer des avortements de boutons.

Préconisation

Le seuil est de 2 colonies au m² et un traitement est **nécessaire** sur un certain nombre de parcelles eu égard à la précocité de l'attaque.

POIS : stade levée à 2 feuilles Sitones

Situation

Le temps n'est pas favorable à leur activité. Les morsures sont rares.

Préconisation

Il est trop tôt pour intervenir.

CEREALES

BLE : stade redressement

Piétin-verse

Situation

Une contamination secondaire **supplémentaire** est intervenue depuis le dernier bulletin. Le risque climatique se maintient à un niveau assez élevé. En parcelles, les symptômes restent rares (fréquence d'attaque inférieure à 10 %).

Préconisation

- Parcelles à risque élevé (note > 13, voir bulletin du 12 février) :

- Stratégie anti-piétin à base de **prochloraz seul** : intervenir à partir de la semaine prochaine ; cependant si les conditions climatiques restent froides, le traitement peut être reporté de 8 jours.

- Autres stratégies (prochloraz en association ou cyprodinil) : **attendre**.

- Parcelles à risque moyen, ou limité, ou très faible (note < = 13) : Ne pas intervenir (voir prochain bulletin).

Maladies foliaires

ROUILLE BRUNE : Se reporter au précédent bulletin.

OIDIUM : Il est présent ponctuellement sur variétés sensibles.

ORGE BRASSERIE : stade levée à 2 feuilles

Pucerons

Pour les semis de printemps en Charente-Maritime, surveiller attentivement la présence de pucerons et intervenir dès leur apparition ; aucun vol n'a été détecté à la tour de Biard.

MAIS

Pyrale

Il est rappelé que les sondages larvaires à l'automne ont indiqué une nette baisse du nombre de larves en 96 et 97 (voir bilan phytosanitaire). En maïs consommation, seul le tiers Nord du département de la Vienne reste un secteur à risque élevé justifiant la prise en compte de ce ravageur en 98.

BLE
Piétin : stratégie en situation à risque élevé

COLZA
Ravageurs : Pucerons à surveiller

Service Régional de la
Protection des Végétaux
13 route de la Forêt
86580 BIARD

Tél : 05 49 62 98 25
Fax : 05 49 62 98 26

Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles de POITOU-
CHARENTES

Directeur-Gérant :
UILLARD CONDAT

Publication périodique
C.P.P.A.P. n° 2139 AD
ISSN n° 02244 470